



фигура 1




динамика на абсолютния брой на мъжете в активна възраст от
 градовете и селата на НРБ през периода 1964 – 1983 г., и на уми-
 раността при тях по календарни години (1964=100%)

фигура 2




динамика на абсолютния брой на мъжете в активна възраст от градовете
селата на НРБ и на умиранията при тях през периода 1964-1983 г. по
възрастови групи (1983/1964, %)

фигура 3




Динамика на абсолютния брой на мъжете в активна възраст от градовете на НРБ през периода 1964 - 1983 г. и на умиранията при тях, по календарни години (1964=100%)

Фигура 4




Промяна на абсолютния брой на мъжете в активна възраст от градовете
РБ и на умираемостта при тях през периода 1964 - 1983 г. по възрастови
групи (1983/1964, %)

фигура 5




Динамика на абсолютния брой на мъжете в активна възраст от селата на НРБ през периода 1964 - 1983 г. и на умирая-та при тях, по календарни години (1964 = 100%)

фигура 6



динамика на абсолютния брой на брой на мъжете в активна възраст от
дата на НРБ и на умиранията при тях през периода 1964-1983 г. по
възрастови групи (1983/1964,%)


Фигура 7



Нозологична структура на умираяните при мъжете в активна възраст по класове и групи болести, местоживеене и подпериоди

Фигура 8

Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, град, 15-64, овца)




Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.937	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 427.60	Slope of regression line = 7.164	Response % = 100
S.D. of Y = 44.11	Y intercept = 352.379	

Regression equation : $Y' = 7.164 X + 352.379$
 Standard error of estimate for regression = 15.460
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.000

Фигура 9


Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, село, 15-64, овца)



Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.929	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 637.55	Slope of regression line = 14.536	Response % = 100
S.D. of Y = 90.23	Y intercept = 484.921	

Regression equation : $Y' = 14.536 X + 484.921$
 Standard error of estimate for regression = 33.402
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.000


Фигура 10



Линейна регресия на коефициентите на общата смъртност на мъжете в активна възраст в НРБ през 1964-1983 г., по местоживееене и възрастови групи

Фигура 11

Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, град, 15-64, клас VII)




Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.981	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 148.95	Slope of regression line = 5.298	Response % = 100
S.D. of Y = 31.14	Y intercept = 93.316	

Regression equation : $Y' = 5.298 X + 93.316$
 Standard error of estimate for regression = 6.015
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.000

Фигура 12


Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, село, 15-64, клас VII)




Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.973	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 228.00	Slope of regression line = 10.580	Response % = 100
S.D. of Y = 62.69	Y intercept = 116.905	

Regression equation : $Y' = 10.580 X + 116.905$
 Standard error of estimate for regression = 14.426
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.000

фигура 13




Линейна регресия на коефициентите за смъртност от болести на органите на кръвообръщението на мъжете в активна възраст в НРБ през 1964-1983 г. по местоживееие и възрастови групи




Линейна регресия на коефициентите за смъртност от хронична ревматична кардиопатия на мъжете в активна възраст в НРБ през 1964-1983 г. по местоживееене и възрастови групи

ГРАД




СЕЛО



Линейна регресия на коефициентите за смъртност от исхемична болест на сърцето при мъжете в активна възраст в НРБ през 1964-1983 г. по местоживее и възраст


ГРАД

фигура 16



Линейна регресия на коефициентите за смъртност от остър инфаркт на миокарда на мъжете в активна възраст в НРБ през 1964-1983 г. по местоживееие и възрастови групи


фигура 17



Линейна регресия на коефициентите за смъртност
от мозъчносъдова болест на мъжете в активна възраст
в НРБ през 1964-1983 г. по местоживеење и възрастови групи

Фигура 18

Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, град, 15-64, клас II)




Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.580	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 99.80	Slope of regression line = 0.711	Response % = 100
S.D. of Y = 7.08	Y intercept = 92.332	

Regression equation : $Y' = 0.711 X + 92.332$
 Standard error of estimate for regression = 5.765
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.007

Фигура 19


Смъртност 0/0000 (регресия, 1964-83, мъже, село, 15-64, клас II)



Mean of X = 10.50	Correlation coefficient = 0.645	Valid cases = 20
S.D. of X = 5.77	Degrees of freedom = 18	Missing cases = 0
Mean of Y = 143.30	Slope of regression line = 1.326	Response % = 100
S.D. of Y = 11.85	Y intercept = 129.374	

Regression equation : $Y' = 1.326 X + 129.374$
 Standard error of estimate for regression = 9.056
 Standard error of correlation coefficient = 0.229
 Significance of correlation coefficient = 0.002

фигура 20



Линейна регресия на коефициентите за смъртност
от новообразувания на мъжете в активна възраст
в НРБ през 1964-1983 г. по местоживеење и възрастови групи